

日本透析医会・日本透析医学会・日本腎臓学会

新型コロナウイルス感染対策合同委員会

委員長 菊地 勘

副委員長 山川智之

副委員長 竜崎崇和

副委員長 南学正臣

透析患者における累積の新型コロナウイルス感染者の登録数

(2021年7月8日16時 時点)

時点	5/27	6/3	6/10	6/17	6/24	7/1	7/8		
患者数 地区	感染者数	転帰不明数 (入院中含む)	死者数						
北海道	70	131	140	142	156	158	158	15	72
東北	31	32	32	32	32	32	32	15	9
北関東	61	61	61	64	64	65	65	41	9
南関東 (東京除く)	353	359	362	367	372	376	379	183	68
東京	464	465	467	469	472	474	480	235	57
甲信越・北陸	30	31	31	31	33	34	37	10	7
東海 (愛知除く)	65	66	67	67	68	71	71	26	20
愛知	95	96	99	99	103	104	105	49	12
近畿 (大阪除く)	130	141	148	152	152	153	153	92	19
大阪	185	193	205	207	209	215	215	80	26
中国	56	65	70	72	78	79	81	25	7
四国	14	14	14	14	14	14	14	8	2
九州・沖縄 (福岡除く)	62	64	64	65	65	66	66	38	6
福岡	141	142	145	145	145	146	147	95	29
合計	1757	1860	1905	1926	1963	1987	2003	912	343

東北 青森・岩手・秋田・宮城・山形・福島

北関東 茨城・栃木・群馬

南関東(東京除く) 埼玉・千葉・神奈川

甲信越・北陸 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野

東海(愛知除く) 岐阜・静岡・三重

近畿(大阪除く) 滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山

中国 鳥取・島根・岡山・広島・山口

四国 徳島・香川・愛媛・高知

九州・沖縄(福岡除く) 佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

患者の詳細情報は次ページ参照。

詳細情報は累積であり、人工呼吸器やECMOの使用既往があれば、人数に含めている。

患者詳細情報

転帰	退院 (隔離解除含む)	死亡	転帰不明 (入院中含む)	全体	腹膜透析患者	腹膜透析	腹膜透析・ 血液透析併用
患者数(腹膜透析含む)	748	343	912	2003			
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	21	4	3	28	患者数	23	5

年代	40歳未満	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	32	176	300	414	526	443	112	2003
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	1	5	7	8	3	4	0	28
転帰不明者数(入院中含む)	14	63	132	191	232	178	102	912
死亡者数	0	11	21	50	113	142	6	343
致死率(%)	0.0	6.3	7.0	12.1	21.5	32.1	5.4	17.1
致死率(%) ^④ (転帰不明者除く)	0.0	9.7	12.5	22.4	38.4	53.6	60.0	31.4

性別	男性	女性	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	1318	563	122	2003
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	21	7	0	28

透析歴	1年未満	1~5年未満	5~10年未満	10~15年未満	15~20年未満	20年以上	情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	213	598	435	218	101	128	310	2003
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	7	16	5	0	0	0	0	28

原疾患	糖尿病性腎症	慢性糸球体腎炎	腎硬化症	その他	不明・情報なし	全体
患者数(腹膜透析含む)	830	291	226	226	430	2003
腹膜透析患者数(血液透析併用含む)	9	8	2	6	3	28

症状	あり	なし	不明・情報なし	全体
37.5°C以上の発熱	1397	312	294	2003
咳嗽	897	762	344	2003
咽頭痛	303	1243	457	2003
頭痛	174	1363	466	2003
鼻汁	234	1330	439	2003
嘔気・嘔吐	144	1441	418	2003
下痢	196	1405	402	2003
嗅覚味覚異常	106	1298	599	2003

肺炎像	あり	明確ではない	非施行	情報なし	全体
胸部X線	653	344	607	399	2003
胸部CT	892	179	558	374	2003

酸素投与	あり	なし	不明・情報なし	全体
酸素投与の有無	691	879	433	2003
呼吸機器の有無	176	1324	503	2003
ECMOの有無	11	1470	522	2003

治療薬	あり	なし	不明・情報なし	全体
レムデシビル(ペクルリー)	172	1249	582	2003
デキサメタゾン(デカドロン)	583	841	579	2003
トリリズマブ(アクテムラ)	56	1366	581	2003
ファビビラビル(アビガン)	383	1039	581	2003
シクレソニド(オルベスコ)	128	1289	586	2003

酸素飽和度 (COVID-19 診断時)

酸素飽和度(%)	89以下	90～93	94～95	96以上	合計
患者数(ルームエラー)	40	47	60	237	384
患者数(酸素投与あり)	9	8	17	26	60

COVID-19 診断時または入院時検査データ

アルブミン(g/dL)	2未満	2～2.5未満	2.5～3未満	3～3.5未満	3.5以上	合計
患者数	8	31	61	103	104	307

尿素窒素(mg/dL)	30未満	30～60未満	60～90未満	90～120未満	120以上	合計
患者数	27	164	120	26	2	339

クレアチニン(mg/dL)	4未満	4～8未満	8～12未満	12～16未満	16以上	合計
患者数	18	118	128	50	27	341

CRP(mg/dL)	1未満	1～5未満	5～10未満	10～15未満	15以上	合計
患者数	95	120	74	39	32	360

白血球数(/ μ L)	3000未満	3000～10000未満	10000～15000未満	15000～20000未満	20000以上	合計
患者数	35	306	25	4	2	372

ヘモグロビン濃度(g/dL)	9未満	9～10未満	10～11未満	11～12未満	12以上	合計
患者数	37	42	97	93	97	366

血小板数(万/ μ L)	10未満	10～20未満	20～30未満	30～40未満	40以上	合計
患者数	74	220	60	9	6	369